

Accouchements par césarienne

La naissance d'enfants par césarienne est l'intervention chirurgicale entraînant une hospitalisation la plus commune au Canada[74]. Une césarienne a souvent lieu lorsqu'on juge que l'accouchement par voie vaginale présente des risques pour la mère ou l'enfant[75]. Dans certains cas, cette intervention peut être salvatrice. Toutefois, étant donné que ce type d'intervention peut entraîner des complications pour la mère ou l'enfant, elle ne devrait être effectuée qu'en cas d'absolue nécessité[75].


Conclusions et variations

Au Canada, au cours des 20 dernières années, le taux de césariennes s'est accru considérablement, pour atteindre plus de 27 % de l'ensemble des accouchements en 2013, de 17 % en 1995[76,77]. Cette hausse constante peut être liée à plusieurs facteurs, dont l'âge des femmes enceintes pour la première fois.

Les données montrent la proportion d'accouchements en Ontario qui étaient des césariennes est restée stable aux alentours de 28 %, entre 2012-2013 et 2013-2014 (Figure 6.11).

FIGURE 6.11

Pourcentage d'accouchements par type d'accouchement chez toutes les femmes, en Ontario, 2012-2013 à 2013-2014



Source des données : Système d'information de BORN (Better Outcomes Registry & Network)

i Indicateur : Accouchements par césarienne

Cet indicateur mesure accouchements par césarienne, en pourcentage de tous les accouchements.

La proportion de césariennes est aussi restée stable, soit environ 13 % entre 2012/13 et 2013-2014 (Figure 6.12). On considère qu'un accouchement est à faible risque lorsqu'une femme qui n'a jamais eu de césarienne donne naissance à un enfant à terme qui se présente la tête vers le bas, sans problème ou complication pour la mère ou le fœtus.


Le taux de césariennes parmi les accouchements à faible risque n'a pas varié considérablement par rapport au revenu de la mère selon le quartier où elle vit, en 2013-2014[78].

Le saviez-vous?

Certaines des raisons les plus communes pour lesquelles les femmes accouchent par césarienne sont une position fœtale anormale, taille du cœur ou rythme cardiaque anormal, césarienne précédente, problèmes de placenta, et âge de la mère[75].

FIGURE 6.12

Percentage of low-risk deliveries by delivery type, in Ontario, by fiscal year, 2012/13 to 2013/14



Source des données: De meilleurs résultats Registre & Réseau Système d'information (BORN) de l'Ontario, fourni par BORN